

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА – ЭТО ВАЖНО!

Подъем заболеваемости гриппом в осенне-зимний период 2017 – 2018 года в ЛНР *ожидается в конце ноября*. По данным Всемирной Организации Здравоохранения прогноз свидетельствует о наибольшей активности в нашем регионе, как и в России и в Украине, в эпидсезон 2017-2018 годов трех вариантов гриппа: тип «А» H1N1 (Калифорния), тип «А» H3N2 (Гонконг) и тип «В» (Брисбен). Большое значение в борьбе с гриппом имеют профилактические мероприятия, среди которых к наиболее существенным относится **вакцинация**. Именно такой штаммовый состав рекомендуется ВОЗ для противогриппозных вакцин нынешнего эпид.сезона.

Вакцинация против гриппа – эффективное и малоопасное мероприятие. Вирус гриппа в 2017-2018 году не будет страшен тем, кто своевременно получил вакцинацию и получил необходимую иммунную защиту. Однако, прививку необходимо сделать не позднее, чем *за две недели до начала эпидподъема заболеваемости гриппом*.

По линии гуманитарной помощи мы получили вакцину «Ультрикс»: в одной дозе (0,5 мл) содержатся антигены вируса гриппа всех вышеперечисленных типов (А-H1N1; А-H3N2 и В). Вакцина вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа. **Защитный эффект** после вакцинации, как правило, **наступает через 8-12 дней** и сохраняется **до 12 месяцев**, в том числе и у пожилых лиц.

В день прививки вакцинируемые должны быть осмотрены врачом (фельдшером) с обязательной термометрией. При температуре 37,0° С и выше вакцинация не проводится.

Вакцина является высокоочищенным препаратом, хорошо переносится детьми и взрослыми. Но у **некоторых лиц может быть реакция на прививку**, что говорит об активной, интенсивной выработке иммунитета.

Частые (от 1 на 10 случ. до 1 на 100 случ). Местные реакции в виде болезненности, покраснения, уплотнения и отёка в месте введения (в диаметре до 5-7 см). Общие реакции: недомогание, слабость, субфебрильная температура.

Нечастые (от 1 на 100 случ. до 1 на 1000 случ.). Общие реакции в виде лёгкого насморка, боли в горле, головной боли и повышения температуры до 38° и выше.

Указанные реакции обычно проходят самостоятельно в течение 1-2 суток.

Пациент должен сообщить врачу о любых выраженных или необычных побочных реакциях.

ВНИМАНИЕ!

Грипп опасен развитием тяжелых осложнений, особенно в детском и пожилом возрасте, у больных с хроническими заболеваниями. Не отказывайтесь от предложенной Вам бесплатной вакцинации против гриппа. Вакцина «Ультрикс» применяется с 6-летнего возраста. Вакцинация начинается с 18 сентября 2017г. в центральной городской поликлинике и в детской поликлинике, после заполнения бланка информированного согласия.