

Столбняк - относится к наиболее опасным инфекционным заболеваниям, которое поражает нервную систему и приводит к смерти инфицированного человека.

Микроорганизмы, вызывающие столбняк, широко распространены в окружающей среде. Вот почему проколы гвоздями мягких тканей или глубокие порезы лезвиями так опасны.

Особенно страшен столбняк у детей или пожилых людей. Именно в этих группах иммунитет против этого заболевания слабый или вообще отсутствует.

Заболееваемость и смертность от столбняка значительно снизились, когда была изобретена вакцина от столбняка. В современном календаре прививок она входит в состав комбинированной вакцины против столбняка, дифтерии и коклюша

Заражение может происходить при:

- травмах - колотые, резаные раны;
- ожогах и обморожениях;
- при родах, через пуповину;
- микротравмах;
- укусах животными или ядовитыми насекомыми.

К характерным признакам столбняка относятся:

- тризм;
- сардоническая улыбка;
- опистотонус;
- затруднение глотания, а также его болезненность;
- тахикардия;
- повышение температуры;
- тонические судороги;
- апноэ;
- цианоз;
- повышенная потливость;
- гиперсаливация.

Важную роль играет профилактика столбняка, которая включает:

1. Предупреждения травматизма и ранняя хирургическая обработка ран.
2. Плановая вакцинация анатоксином - детям от 3-х лет до 17 лет, а также взрослым каждые 10 лет ревакцинация.
3. Экстренная вакцинация - проводится при любых травмах с повреждением кожного покрова, ожогах, укусах животных и т.д.

Поэтому при любых травмах и особенно сомнениях необходимо незамедлительно обратиться к травматологу.